

© А. Я. Сенчук, Р. М. Закордонець, І. І. Чермак

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»

**ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПАТОЛОГІЇ МАТКИ У ХВОРИХ  
З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ**

**Мета дослідження** – оцінка ефективності й безпечності використання внутрішньоматкової криохірургії для лікування поєднаної патології ендометрія та міометрія в пацієнток у перименопаузі, які мають соматичну патологію.

**Матеріали та методи.** Обстежено і проліковано 100 пацієнток із гіперплазією ендометрія і складною соматичною патологією. Вік пацієнток варіював від 46 до 60 років і в середньому становив (54,2±6,7) року. Криохірургічні втручання проводили за допомогою установки «Кріо-Пульс», у якій як холодоагент використовують рідкий азот. Температура кріоаплікатора залежала від патоморфологічного діагнозу і збільшувалися нами у випадках комплексної (аденоматозної) неатипової гіперплазії в поєднанні з аденоміозом. Для профілактики запальних і ТЕУ в післяопераційному періоді призначали перорально антибактеріальні та ректально тромболітичні препарати. У випадках високого ризику виникнення ТЕУ хворим рекомендували прийом НМГ, еластичну компресію нижніх кінцівок і прийом судинних препаратів протягом 2–3-х місяців.

**Результати дослідження та їх обговорення.** На підставі результатів комплексного обстеження до та після використання запропонованої терапії і профілактики ускладнень лікування поєднаної патології ендометрія та міометрія, на підставі результатів диспансерного спостереження за пацієнтками протягом від 1-го до 6-ти років автори визначилися із критеріями ефективності терапії. Через 3 місяці і під час наступних 2-х років диспансерного спостереження це має бути: відсутність скарг, відсутність скарг під час бімануального обстеження, зменшення розмірів матки (УЗД), товщина ендометрія 3–4 мм, від'ємні результати патоморфологічного дослідження аспіратів з порожнини матки. Ефективність лікування, за даними клінічного обстеження і результатами УЗД, становила 82,0 %, профілактики ТЕУ та запальних ускладнень – 100 % випадків.

**Висновки.** 1. Пацієнток перименопаузального періоду з поєднаною патологією ендометрія та міометрія на тлі екстрагенітальної патології слід захищати до групи ризику виникнення ТЕУ.

2. Методом вибору лікування та профілактики запальних і ТЕУ в таких хворих може бути внутрішньоматкова хірургія в поєднанні з тромбопрофілактикою.

3. Клінічна апробація патогенетично обґрунтованого лікувально-профілактичного методу показала його високу ефективність і нешкідливість для гінекологічних хворих із тяжкою соматичною патологією.

**Ключові слова:** гіперпластичні процеси ендометрія; міометрія; соматична патологія; лікування; профілактика.

**ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ**

**Цель исследования** – оценка эффективности и безопасности использования внутриматочной криохирургии для лечения сочетанной патологии эндометрия и миометрия у пациенток в перименопаузе, имеющих соматическую патологию.

**Материалы и методы.** Обследовано и пролечено 100 пациенток с гиперплазией эндометрия и сложной соматической патологией. Возраст пациенток колебался от 46 до 60 лет и в среднем составил (54,2±6,7) года. Криохирургические вмешательства проводили с помощью установки «Крио-Пульс», в которой в качестве хладагента используется жидкий азот. Температура криовоздействия на патологический эндометрий составляла от -140 до -170 °С. Длительность криовоздействия и температура криоаплікатора зависели от патоморфологического диагноза и увеличивались в случаях комплексной (аденоматозной) неатипической гиперплазии в сочетании с аденомиозом. Для профилактики воспалительных и ТЭО в послеоперационном периоде назначали перорально антибактериальные и ректально тромболитические препараты. В случаях высокого риска возникновения ТЭО больным рекомендовали прием низкомолекулярных гепаринов, эластическую компрессию нижних конечностей и прием сосудистых препаратов в течение 2–3-х месяцев.

**Результаты исследования и их обсуждение.** На основании результатов комплексного обследования до и после использования предложенной нами терапии и профилактики осложнений лечения сочетанной патологии эндометрия и миометрия, на основании результатов диспансерного наблюдения за нашими пациентками в течение от 1-го до 6-ти лет авторы определились с критериями эффективности терапии. Через 3 месяца и во время последующих 2-х лет диспансерного наблюдения критериями должны быть: отсутствие жалоб, отсутствие жалоб при бимануальном исследовании, уменьшение размеров матки (УЗИ), толщина эндометрия 3–4 мм, отрицательные результаты патоморфологического исследования аспіратов из полости матки. Эффективность лечения, по данным клинического обследования и результатам УЗИ, составила 82,0 %, профилактики ТЭО и воспалительных осложнений – 100 % случаев.

**Выводы.** 1. Пациенток перименопаузального периода с сочетанной патологией эндометрия и миометрия на фоне экстрагенитальной патологии следует отнести к группе риска возникновения ТЭО.

2. Методом выбора лечения и профилактики воспалительных и ТЭО у таких больных может быть внутриматочная хирургия в сочетании с тромбопрофілактикой.

3. Клиническая апробація патогенетически обоснованного лечебно-профілактического метода показала его высокую эффективность и безвредность для гинекологических больных с тяжелой соматической патологией.

**Ключевые слова:** гиперпластические процессы эндометрия; миометрия; соматическая патология; лечение; профилактика.

### ORGAN-SAVING THERAPY OF UTERINE PATHOLOGY IN PATIENTS WITH EXTRAGENITAL PATHOLOGY

**The aim of the study** – to assess the effectiveness and safety of using intrauterine cryosurgery for the treatment of combined pathology of endo- and myometrium in patients in perimenopause who have a somatic pathology.

**Materials and Methods.** 100 patients with endometrial hyperplasia and complex somatic pathology were examined and treated. The age of patients ranged from 46 to 60 years and averaged (54.2±6.7) years. Cryosurgical interventions were performed with the help of Cryo-Pulse installation in which liquid nitrogen is used as coolant. The temperature of cryoexposure to the pathological endometrium was from -140° to -170°C. The duration of cryoexposure and the temperature of the cryoapplicator depended on the pathomorphological diagnosis and increased in cases of complex (adenomatous) non-atypical hyperplasia in combination with adenomyosis. For the prevention of inflammatory and TEC in the postoperative period, oral antibacterial and rectally thrombolytic drugs were prescribed. In cases of high risk of developing a TEC, patients were recommended to take low-molecular heparins, elastic compression of the lower extremities, and taking vascular medications within 2–3 months.

**Results and Discussion.** Based on the results of the complex examination before and after using our therapy and prevention of complications in the treatment of combined pathology of endo- and myometrium, based on the results of dispensary monitoring of our patients for 1 to 6 years, we determined the criteria for the effectiveness of therapy. After 3 months and during the next 2 years of follow-up, the criteria should be: no complaints, no complaints during bimanual examination, a decrease in the size of the uterus (ultrasound), thickness of the endometrium 3–4 mm, negative results of pathomorphological examination of aspirates from the uterine cavity. According to our results, the effectiveness of treatment, according to the clinical examination and the results of ultrasound, was 82.0 %, prevention of TEC and inflammatory complications – 100 % of cases.

**Conclusions.** 1. Patients of the perimenopausal period with combined pathology of endo- and myometrium on the background of extragenital pathology should be attributed to the risk group for the development of TEC.

2. The method of choice of treatment and prevention of inflammatory and TEC in such patients may be intrauterine surgery in combination with thromboprophylaxis.

3. Clinical approbation of the pathogenetically substantiated therapeutic-prophylactic method has shown its high efficiency and harmlessness for gynecological patients with severe somatic pathology.

**Key words:** hyperplastic processes of endo- and myometrium; somatic pathology; treatment; prevention.

**ВСТУП.** Статистичні звіти і дані наукової літератури вказують на неухильне зростання високої частоти гіперпластичних процесів ендометрія (ГПЕ) і раку ендометрія [1, 2]. Найвразливішими відносно раку ендометрія є жінки перименопаузального періоду, і більше половини випадків цього раку в них – це результат малігнізації ГПЕ [2, 3]. Актуальність проблеми обумовлена також тим, що від 65 до 80 % жінок перименопаузального періоду мають різну екстрагенітальну патологію, яка є протипоказанням до використання специфічної гормональної терапії і хірургічних втручань [4, 5]. Використання гормональних препаратів для лікування передпухлинних захворювань ендо- і міометрія має низку протипоказань, гормональна терапія не має сенсу за тяжких форм передпухлинної патології ендометрія, й нерідко її призначення спричиняє тяжкі ускладнення, передусім тромбоемболічні [1, 5].

Радикальні методи (хірургічні втручання в обсязі надпівкової ампутації та екстирпації матки) травматичні, зазвичай призводять до видалення органа, хірургічної кастрації (частота оваріоектомії після 45 років сягає 90,0 %), наступних психосоматичних проблем, пов'язаних з утратою менструальної й репродуктивної функції жінки. Окрім цього, операційна і психічна травми, шкідливий вплив наркозу, обмеження рухової активності в післяопераційному періоді, і все це на тлі наявності генітальної і соматичної патології у жінок переважно після 35 років життя – це фактори ризику, які зумовлюють високий ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ) у даній категорії пацієнок [4, 6].

Викладене вище обумовлює незадовільний стан питання про своєчасне, ефективне, безрецидивне і безпечне лікування поєднаної патології матки й ендометрія в жінок пізнього репродуктивного періоду. Запізніле звернення по допомогу, багаторазові вишкрібання без наступного призначення адекватного лікування або взагалі відсутність лікування призводять до рецидивування

захворювання, його прогресування у тяжкі форми гіперплазії (аденоматоз) і рак ендометрія.

Саме тому своєчасна діагностика й адекватна, з урахуванням наявної соматичної патології у хворих у періоді перименопаузи, є залогом успішної профілактики раку даної локалізації.

**МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ** – оцінка ефективності й безпечності використання внутрішньоматкової кріохірургії для лікування поєднаної патології ендо- та міометрія в пацієнок у перименопаузі, які мають соматичну патологію.

**МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ.** Клініко-лабораторному (загальний аналіз крові, бактеріоскопія мазків з піхви), інструментальному (діагностичне вишкрібання, гістероскопія), патоморфологічному й апаратному (УЗД, доплерометрія) обстеженню піддано 100 пацієнок із ГПЕ, що мають складну соматичну патологію. У наших хворих (основна група – 60 хворих) до та після запропонованого (1-ша група – 30 хворих) і загальноприйнятого (2-га група – 30 хворих) лікування ми також дослідили показники системи гемостазу, а саме такі його ланки, як: тромбоцитарна (кількість тромбоцитів, їх агрегаційна спроможність та сумарний індекс агрегації тромбоцитів (СІАТ), система зсідання (автокоагуляційний тест, тромбіновий час, протромбіновий індекс, концентрація фібриногену). Стан системи фібринолізу визначали за такими показниками, як: плазмовий лізис, рівень вільного гепарину, активність антитромбіну III, показники етанолового і протамінсульфатного тестів, концентрація розчинного фібрину в плазмі крові [7]. Контролем слугували дані обстеження 30 соматично і гінекологічно здорових жінок відповідного віку.

Кріохірургічні втручання проводили за допомогою установки «Кріо-Пульс», у якій як холодоагент використовується рідкий азот. Температура кровопливу на патологічний ендометрій становила від -140 до -170 °С. Тривалість кровопливу і температура кріоаплікатора залежали від патоморфологічного діагнозу і збільшувалися

нами у випадках комплексної (аденоматозної) неатипової гіперплазії в поєднанні з аденоміозом. Процедура проводилася в умовах малої операційної під парацервікальною аналгезією. Для профілактики запальних і ТЕУ в післяопераційному періоді призначали перорально антибактеріальні та ректально тромболітичні препарати. У випадках високого ризику виникнення ТЕУ хворим рекомендували прийом НМГ, еластичну компресію нижніх кінцівок і прийом судинних препаратів протягом 2–3-х місяців.

Гормональну терапію у даних хворих виключали внаслідок її неефективності в минулому або категоричної відмови пацієнтки, наявності соматичних захворювань і пов'язаного з ними високого ризику виникнення ускладнень і передусім ТЕУ. Хірургічні методи лікування (гістеректомія, гістероскопія з гістерорезекцією ендометрія) також були пов'язані з розвитком запальних і ТЕУ.

Умовами для проведення внутрішньоматкової кріохірургії були:

1. Інформована згода пацієнтки.
2. Компенсований стан соматичної патології (АТ, цукру крові тощо).
3. Патоморфологічне підтвердження діагнозу ГЕ без клітинної атипії з давністю дослідження не більше двох місяців.
4. I–II ступінь чистоти вагінальної флори.
5. Довжина порожнини матки не більше 12 см і відсутність ознак вираженої її деформації.
6. Незалежно від дня менструального циклу та/або у разі нерясних кров'яних виділень з метою гемостазу.

Статистична обробка матеріалів проведена з використанням пакета аналізу Microsoft Excel та за допомогою комп'ютерних програмних продуктів, які входять у пакет Microsoft Office Professional 2000.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

Вік пацієнток варіював від 46 до 60 років і в середньому склав  $54,2 \pm 6,7$  року.

Залежно від результатів УЗД і патоморфологічного дослідження всі пацієнтки розподілилися у такий спосіб: проста неатипова ГЕ – 42 (42,0 %), комплексна неатипова ГЕ (23,0 %), поліпи (залозистий і залозисто-фіброзний) ендометрія – 35,0 %. Усі випадки ГЕ були в поєднанні з аденоміозом I та II ступенів.

У структурі екстрагенітальної патології переважали: варикоз вен нижніх кінцівок – 61 (61,0 %), артеріальна гіпертензія 2-3 стадії – 46 (46,0 %); ішемічна хвороба серця, стенокардія – 8 (8,0 %); ожиріння – 43 (43,0 %), захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози – 52 (52,0 %). У 78,0 % хворих соматична патологія була представлена двома і більше діагнозами.

Результати комплексного обстеження пацієнток перименопаузального періоду з поєднаною патологією ендометрія на тлі екстрагенітальної патології показали, що до тромбофілічно значущих чинників ризику у такої категорії хворих слід зараховувати патологію ендометрія, вік понад 45 років, приймання гормональних препаратів, захворювання серцево-судинної системи (гіпертензія, варикозна хвороба) та іншу тяжку екстрагенітальну патологію. Тромбогенний потенціал у хворих із поєднаною патологією ендометрія підвищується за наявності порушень гемодинаміки в ураженому органі і супутнього порушення мікроекології статевих органів. Наявність перерахованих факторів у поєднанні зі змінами в системі гемостазу (судинно-тромбоцитарна ланка, плазмовий гемостаз і система фібринолізу) вказувала на наявність середнього та високого ризику виникнення ТЕУ і вимагала проведення тромбопрофілактики.

Через 1 місяць після лікування ми досліджували стан системи гемостазу в наших пацієнток і відзначили позитивний вплив запропонованого методу лікування на цю систему (табл. 1). Так, у першу чергу, на відміну від хворих із ГПЕ і аденоміозом, нормалізувалася кількість тромбоцитів, вона не відрізнялася від кількості тромбоцитів у здорових жінок. Про нормалізацію агрегаційної здатності тромбоцитів свідчив показник їх агрегації. Показники після лікування достовірно зменшилися ( $p < 0,05$ ) і наблизилися до стану агрегації тромбоцитів у здорових жінок ( $p > 0,05$ ).

Є тенденція до нормалізації стану системи згортання. Про нормалізацію цієї системи свідчать позитивні реакції етанолового тесту, кількість яких зменшилася на відміну від показників до лікування, а саме з 97,3 до 63,6 %. Це, на нашу думку, свідчить про відсутність негативного впливу застосованого методу терапії на систему гемостазу і високу ефективність ендокріохірургічного лікування ГПЕ в сполученні з аденоміозом.

У таблиці 2 наведені показники фібринолітичної ланки системи гемостазу до та через 1 місяць після лікування. Аналіз результатів, наведених у таблиці 2, вказує на значні позитивні зсуви у системі фібринолізу через місяць після застосування запропонованого нами лікування (I група). Показники плазмового лізису і АТ-III майже не відрізняються від здорових жінок. Після загальноприйнятої терапії (II група) показники фібринолізу були достовірно ( $p < 0,05$ ) гіршими порівняно з відповідними показниками в КГ та в групі пацієнток після кріохірургічного лікування й застосування заходів профілактичних для профілактики запальних і ТЕУ.

На підставі результатів комплексного обстеження до та після використання запропонованої нами терапії і профілактики ускладнень лікування поєднаної патології ендометрія, на підставі результатів диспансерного спостереження за нашими пацієнтками протягом від 1-го

Таблиця 1. Показники судинно-тромбоцитарного гемостазу до та через місяць після лікування ( $M \pm m$ )

Досліджений показник	Основна група (n=50)	КГ (n=30)	I група (n=30)	II група (n=30)
Кількість тромбоцитів ( $1 \times 10^9$ )	$159,5 \pm 12,7$	$226,5 \pm 11,3$	$189,7 \pm 9,1^*$	$142,5 \pm 11,6^{**}$
Агрегація тромбоцитів (%)	$42,3 \pm 4,4$	$29,5 \pm 2,8$	$29,7 \pm 4,1^*$	$39,3 \pm 3,3^{\Delta}$
СІАТ (%)	$42,1 \pm 4,9$	$37,9 \pm 5,4$	$39,1 \pm 5,4$	$36,8 \pm 5,0$

Примітка. \* –  $p < 0,05$  між показниками у КГ та II групі; \*\* –  $p < 0,05$  між показниками у КГ та I групі;  $\Delta$  –  $p < 0,05$  між першою і другою групами.

Таблиця 2. Показники фібринолітичної ланки системи гемостазу до та через місяць після лікування (M±m)

Досліджений показник	Основна група (n=50)	КГ (n=30)	I група (n=30)	II група (n=30)
Плазмовий лізис (с)	213,9±11,2*	154,3±9,1	161,8±5,8 <sup>Δ</sup>	227,9±7,2**
Вільний гепарин (с)	1,1±0,4	0,7±0,1	0,8±0,3	1,0±0,3
АТ-III (%)	57,3±3,3*	69,3±2,2	65,9±2,1 <sup>Δ</sup>	59,2±3,1**
Протамінсульфатний тест (мг %)	3,8±0,6	4,4±0,8	3,9±0,6	3,7±0,4
Розчинний фібрин (+)	3,9±0,4*	0,9±0,2	1,1±0,3	3,7±0,3**

Примітка. \* – p<0,05 між показниками КГ та основної групи; \*\* – p<0,05 між показниками у КГ та 2-й групі; Δ – p<0,05 між першою і другою групами.

до 6-ти років ми визначились із критеріями ефективності терапії.

Через 3 місяці і під час наступних 2-х років диспансерного спостереження це має бути: відсутність скарг, відсутність скарг під час бімануального обстеження, зменшення розмірів матки (УЗД), товщина ендометрія 3–4 мм, від'ємні результати патоморфологічного дослідження аспіратів з порожнини матки.

Отже, ефективність лікування, за даними клінічного обстеження і результатами УЗД, становила 82,0 %, профілактики ТЕУ та запальних ускладнень – 100 % випадків.

**ВИСНОВКИ.** 1. Пацієнтку перименопаузального періоду з поєднаною патологією ендометрія та міометрія на тлі екстрагенітальної патології слід зараховувати до групи ризику виникнення ТЕУ.

2. Методом вибору лікування та профілактики запаль-

них і ТЕУ в таких хворих може бути внутрішньоматкова хірургія в поєднанні з тромбопрофілактикою.

3. Клінічна апробація патогенетично обґрунтованого лікувально-профілактичного методу показала його високу ефективність і нешкідливість для гінекологічних хворих із тяжкою соматичною патологією.

**ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.**

Необхідний подальший пошук ефективних і нешкідливих методів лікування передпухлинних захворювань ендометрія у пацієнток перименопаузального віку з екстрагенітальною патологією. У цьому плані перспективним є використання методів ендохірургії матки з використанням електро-, лазеро- і кріовпливу на патологічне вогнище в ендометрії. Удосконалення потребують також методи контролю ефективності органозберігального лікування патології ендометрія.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Клинический взгляд на гиперплазию и интраэпителиальную неоплазию эндометрия – молекулярно-генетические механизмы у пациенток климактерического возраста / П. Н. Веропотвелян, Н. П. Веропотвелян, А. А. Бондаренко, И. Ю. Гужевская // *Здоровье женщины.* – 2015. – № 8 (104). – С. 146–150.

2. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия / В. Н. Запорожан, Т. Ф. Татарчук, В. Г. Дубинина, Н. В. Косей // *Репродуктивная эндокринология.* – 2012. – № 1. – С. 5–12.

3. Эффективность использования гистероскопической абляции эндометрия у женщин пери- и постменопаузы с гиперпластическими процессами эндометрия / В. А. Бенюк, Я. М. Винярский, В. Н. Гончаренко, Е. А. Щерба // *Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.* – К. : Поліграф-плюс, 2013. – С. 26–28.

4. Корниенко С. М. Особенности анамнеза при патоло-

гии эндометрия у женщин перименопаузального возраста / С. М. Корниенко // *Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.* – 2016. – № 2 (38). – С. 240–244.

5. Шурпяк С. О. Оцінка якості життя жінок з поєднаними доброякісними проліферативними захворюваннями репродуктивних органів / С. О. Шурпяк // *Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.* – 2016. – № 2 (38). – С. 384–387.

6. Бенюк В. О. Рациональна тактика оперативно-го лікування жінок постменопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія / В. О. Бенюк, В. М. Гончаренко, О. П. Мельничук // *Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.* – 2016. – № 2 (38). – С. 42–47.

7. Сенчук А. Я. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии : монография / А. Я. Сенчук, Б. М. Венцовский. – К. : Макком, 2003. – 360 с.

**REFERENCES**

1. Veropotvelyan, P.N., Bondarenko, A.A., & Guzhevskaya, I.Yu. (2015). Klinicheskiy vzglyad na giperplaziyu i intraepitelialnuyu neoplaziyu endometriya – molekulyarno-geneticheskiye mekhanizmy u patsiyentok klimaktericheskogo vozrasta [Clinical view on hyperplasia and intra-epithelial neoplasia of the endometrium – molecular genetic mechanisms in patients of climacteric age].

*Zdorovye zhenshchiny – Women's Health*, 8 (104), 146-150 [in Russian].

2. Zaporozhan, V.N., Tatarchuk, T.F., Dubinina, V.G., & Kosey, N.V. (2012). Sovremennaya diagnostika i lecheniye giperplasticheskikh protsessov endometriya [Modern diagnostics and treatment of hyperplastic processes of the endometrium].

*Reproduktivnaya endokrinologiya – Reproductive Endocrinology*, 1, 5-12 [in Russian].

3. Benyuk, V.A., Vinyarskii, Ya.M., Goncharenko, V.N., & Shcherba, Ye.A. (2013). Effektivnost ispolzovaniya gisteroskopicheskoy ablyatsii endometriya u zhenshchin peri- i postmenopauzy s giperplasticheskimi protsessami endometriya [Efficacy of using hysteroscopic ablation of endometrium in peri-and postmenopausal women with hyperplastic endometrial processes.]. *Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekologiv Ukrainy – Collection of Scientific Works of Association of Obstetrician-Gynecologists*. Kyiv: Polihraf-plius [in Ukrainian].

4. Korniyenko, S.M. (2016). Osobennosti anamneza pri patologii endometriya u zhenshchin premenopauzalnogo vozrasta [Features of anamnesis in the pathology of the endometrium in premenopausal women]. *Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekologiv Ukrainy – Collection of scientific works of the Association of Obstetricians-Gynecologists of Ukraine*, 2 (38), 240-244 [in Ukrainian].

5. Shurpiak, S.O. (2016). Otsinka yakosti zhyttia zhinok z

poiednanymy dobroiakisnymy proliferatyvnymy zakhvoriuvaniamy reproduktyvnykh orhaniv [Assessment of quality of life of women with combined benign reproductive organs proliferative diseases]. *Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekologiv Ukrainy – Collection of Scientific Works of the Association of Obstetricians-Gynecologists of Ukraine*, 2 (38), 384-387 [in Ukrainian].

6. Beniuk, V.O., Honcharenko, V.M., & Melnychuk, O.P. (2016). Ratsionalna taktyka operatyvnoho likuvannya zhinok postmenopauzalnogo viku z hiperplastychnymy protsesamy endometriia [Rational tactics of operative treatment of women of postmenopausal age with hyperplastic processes of endometrium]. *Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekologiv Ukrainy – Collection of scientific works of the Association of Obstetricians-Gynecologists of Ukraine*, 2 (38), 42-47 [in Ukrainian].

7. Senchuk, A.Ya., & Ventskovskiy, B.M. (2003). *Tromboembolicheskoye oslozhneniya v akusherstve i ginekologii: monografiya [Thromboembolic complications in obstetrics and gynecology: monograph]*. Kyiv: Makkom [in Russian].

Отримано 05.03.18