

Н.І. Іль на, М.Д. Чемич, В.В. Захлебаєва, Н.О. Капустян

**КЛІНІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ
БЕШИХИ**

Сумський державний університет, медичний інститут

Проаналізовано клінічні особливості перебігу бешихи. Встановлено, що на бешиху частіше хворіють жінки старші 40 років. Спостерігається зростання частоти первинної бешихи і зниження відсотка рецидивної. У структурі захворювання переважає еритематозна форма недуги. Основною локалізацією місцевого запального процесу є нижні кінцівки. Реєструється зниження розвитку ускладнень бешихи.

Ключові слова: бешиха, клініка, особливості.

Проблема мінливості інфекційних хвороб – одна із важливих в інфектології. Це не випадковий, а закономірний процес, що виникає при взаємодії організму хворого і зовнішнього середовища. Він пов'язаний з безконтрольним застосуванням антибактерійних препаратів, зміною біологічних властивостей збудника, зсувами в імунній системі організму людини під впливом природних і соціальних факторів.

Крім тенденції до зниження летальності, частоти ускладнень, збільшення випадків середньотяжкого і легкого перебігу інфекційних хвороб, характерним став хронічний і затяжний перебіг захворювань [1]. Ці зміни не обійшли і бешиху. Протягом багатьох років вважали тяжкою епідемічною хворобою з небезпечними ускладненнями і значною летальністю. У наш час існуючі уявлення про хворобу суттєво змінилися. Бешиха стала спорадичною малоконтагіозною хворобою [2].

Еволюція відбулась і в клінічному перебігу. У середині 70-80-х років минулого століття домінували геморагічні форми бешихи, збільшилась частота захворювань з тривалою гарячкою, повільною репарацією у вогнищі запалення. Причиною цих процесів, крім імунологічних змін в організмі хворого, було формування нових клонів стрептококу, що підтверджувалось зростанням захворюваності на тяжкі інвазивні форми стрептококових інфекцій, появою нових форм – синдрому токсичного шоку, некротичного міозиту тощо. Відмічалось зростання захворюваності на скарлатину, ревматизм, стрептококовий фарингіт [3-5]. З початку третього тисячоліття спостерігається

тенденція до зменшення геморагічних форм бешихи та збільшення числа первинних. За поширеністю і захворюваністю недуга посідає четверте місце серед інфекційно патології [6]. Розвиток рецидивів, ускладнень, що призводять до тривало непрацездатності, в окремих випадках до інвалідизації, зростання захворюваності серед осіб працездатного віку свідчать про те, що ця хвороба не втрачає своє актуальності і сьогодні.

Мета роботи – вивчити особливості епідеміології і клінічного перебігу сучасно бешихи.

Матеріали і методи

Проведений аналіз епідеміологічних особливостей, структури клінічних форм, преморбідного фону, перебігу бешихи у хворих, що перебували на лікуванні у Сумській інфекційній клінічній лікарні ім. З.Й. Красовицького у 2004-2013 рр. Обстежено 483 особи загальноприйнятими клінічними та лабораторними методами дослідження, які заносили в «Електронну карту досліджень». Результати клінічних спостережень і досліджень були піддані статистичній обробці з використанням програми Microsoft Excel. Вірогідною вважали різницю $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

Серед обстежених пацієнтів, госпіталізованих з бешихою, переважали жінки (59,2 %) старші 40 років (67,3 %), що збігається з дослідженнями інших авторів [7, 8]. Ймовірно, що переважання у віковій структурі осіб старшого віку зумовлено повторною сенсibiliзацією гемолітичним стрептококом протягом життя та наявністю інших патологічних станів [9, 10].

Аналізуючи перебіг бешихи за кратністю, встановлено, що найбільше було первинних форм недуги (табл. 1), які з 2004 р. зросли вдвічі – з 33,1 до 66,1 %.

Тяжкість перебігу у 2/3 осіб був середнього ступеня, у 30,7 % – тяжкого. Останній з однаковою частотою реєструвався як при первинній (16,2 %), так і рецидивній бешиці (13,7 %).

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 1

Залежність тяжкості перебігу бешихи від кратності

Кратність перебігу бешихи	Кількість хворих (абс./%)	Ступінь тяжкості (абс./%)		
		Легкий	Середній	Тяжкий
Первинна	319/66,1	14/2,9	227/47,0	78/16,2
Рецидивна	133/27,5	6/1,2	61/12,6	66/13,7
Повторна	31/6,4	2/0,4	25/5,2	4/0,8
Разом	483/100,0	22/4,5	313/64,8	148/30,7

З клінічних форм у половини пацієнтів (241 особа, 49,9 %) діагностовано еритематозну, бульозна (28,6 %) і геморагічна (19,9 %) форми реєструвались рідше (в 1,7 і 2,3 разу відповідно).

Місцевий процес переважно локалізувався на нижніх кінцівках – 299 (61,9 %), з меншою частотою

на обличчі – 114 (23,6 %), на верхніх кінцівках і тулубі – 66 (13,7 %), інша локалізація була у 4 (0,8 %) хворих. Рецидиви хвороби та повторна бешиха найчастіше спостерігались також на нижніх кінцівках (табл. 2).

Таблиця 2

Локалізація запальних змін при бешихі

Клінічна форма бешихи за кратністю	Локалізація процесу (абс./%)			
	Нижні кінцівки	Верхні кінцівки і тулуб	Обличчя	Інша
Первинна	154/31,9	55/11,4	106/22	4/0,8
Рецидивна	118/24,4	11/2,3	4/0,8	-
Повторна	27/5,6	-	4/0,8	-
Разом	299/61,9	66/13,7	114/23,6	4/0,8

Таким чином, важливою особливістю сучасно бешихи є збільшення питомо частки еритематозно форми. Відбувається еволюція клінічного перебігу бешихи від геморагічно, що домінувала у 80-90-х роках минулого століття і характеризувалася тяжким перебігом з повільною репарацією у вогнищі запалення, до еритематозних форм переважно середнього ступеня тяжкості. Причиною цього явища, ймовірно, є зміна М-штама гемолітичного стрептокока групи А, який превалував у той час і спричиняв розвиток геморагічних форм бешихи [11]. Слід зауважити, що останні не втрачають свого домінування в інших регіонах світу, зокрема в Росі [4].

Залежно від локалізації патологічного процесу, клінічний перебіг бешихи також мав свої особливості. Бульозні форми недуги розвивались тільки на нижніх кінцівках, жодного випадку цієї форми іншої локалізації ми не зустрічали. Для них характерне утворення ерозій, розвиток лімфангітів, лімфаденітів, некрозу шкіри. Геморагічні форми також локалізувались на нижніх кінцівках. Бешиха обличчя мала більш легкий перебіг без рецидивів, з клінічних форм домінувала еритематозна (97,7 %). Недуга з локалізацією на верхніх кінцівках і тулубі розвивалася на тлі післяопераційного лімфостазу у жінок з мастектомією, мала схильність до розвитку рецидивів.

У більшості пацієнтів (98,1 %) початок бешихи був гострим і характеризувався швидким розвитком симптомів інтоксикації, які передували місцевим проявам хвороби від кількох годин до 1-2 діб. Температура тіла сягала 38-40 °С (97,9 %). Пацієнти скаржилися на: головний (98,2 %) і м'язовий (71,4 %) біль, артралгії (17,8 %), нудоту і блювання (14,2 %). У частини хворих у ділянці майбутніх локальних уражень з'являлися парестезії, відчуття розпирання, печіння, помірний біль. Слід відмітити, що при первинній бешихі у 82,4 % осіб поява гіперемії спостерігалась у першу добу, при рецидивній – переважно на другу. Регіонарний лімфаденіт розвивався у 57,1 % осіб, лімфангіт – у 44,2 %.

При еритематозній формі бешихи вогнищеві ураження тривали 5-7 діб, при бульозній і геморагічній – 12-18. Тривалість гарячки при неускладненому перебігу не перевищувала 5-6 діб. Після перенесено хвороби майже у половини (47,1 %) хворих відмічались залишкові явища: пігментація шкіри, вогнищева застійна гіперемія, лімфостаз нижніх кінцівок.

Для визначення типу інфекції (екзогенна або ендогенна) велике значення має виявлення провокуючих факторів, що передували і сприяли розвитку бешихи. Вони були наявні у 81,2-80,4 % хворих (табл. 3).

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 3

Провокуючі фактори у хворих на бешиху (%)

Провокуючий фактор	Бешиха	
	Первинна	Рецидивна
Мікротравми шкіри	38,8	13,1
Міжпальцева поприлість	14,3	52,2
Переохолодження	22,4	8,6
Перенесені ангіни, ГРЗ	6,1	5,4
Нервово-емоційні стреси	4,1	1,1
Не виявлено	14,3	19,6

Як видно з таблиці 3, у половини обстежених розвитку хвороби сприяли uszkodження шкіри (подряпини, розчухи, мікротравми). Первинній бешисі частіше передували мікротравми, переохолодження і міжпальцева поприлість. При рецидивній формі серед місцевих факторів, що сприяли активізації процесу, були міжпальцева поприлість і мікротравми

шкіри. Не виявлено провокуючих факторів у кожного п'ятого хворого.

Факторами ризику розвитку бешихи є супутні хвороби [12]. За нашими даними, ця патологія визначалась у 72,2 % обстежених хворих на бешиху, переважно в осіб з рецидивною формою (табл. 4).

Таблиця 4

Частота супровідно патологі у хворих на бешиху (%)

Супровідна патологія	Бешиха	
	Первинна	Рецидивна
Ожиріння	49,3	68,4
Варикозна хвороба нижніх кінцівок	26,1	48,2
Цукровий діабет	9,8	14,9
Мікози стоп	8,6	19,1
Трофічні виразки	7,6	9,8
Лімфедема нижніх кінцівок	4,2	12,5
Мастектомія	3,1	11,2
Екзема	3,4	4,9

Супутня патологія більш притаманна хворим на рецидивну бешиху, яка розвивалась на тлі ожиріння, варикозно хвороби вен нижніх кінцівок, цукрового діабету, а при локалізації процесу на верхніх кінцівках і тулубі на тлі післяопераційного лімфостазу в зв'язку з мастектомією у жінок.

Ускладнення бешихи спостерігались у 38 (7,9 %) пацієнтів з бульозною формою із локалізацією на нижніх кінцівках і мали місцевий характер: абсцес – у 14 осіб, флегмони – у 7, некрози шкіри – у 6; флебіт – у 4, тромбофлебіт – у 7. Ускладнення розвивались частіше на другому тижні захворювання, переважно у жінок старше 60 років із супутньою патологією (ожиріння, цукровий діабет, варикозна хвороба).

У клінічному аналізі крові відмічався помірний лейкоцитоз $(9,5 \pm 0,6) \times 10^9/\text{л}$ у хворих без супутньої патологі, в осіб з фоновими захворюваннями – значний $(17,05 \pm 0,44) \times 10^9/\text{л}$ ($p < 0,05$), мав нейтрофільний характер; ШОЕ $(7,0 \pm 0,7)$ та $(16,1 \pm 0,9)$ мм/год відповідно. Показники червоно крові були у межах норми.

Таким чином, проведені дослідження дають підставу зробити певні висновки про клініко-епідеміологічні особливості сучасно бешихи.

Висновки

1. На бешиху частіше хворіють жінки старше 40 років.
2. Спостерігається зростання первинно бешихи (66,1 %) і зниження відсотка рецидивно (27,5 %).
3. У структурі захворювання переважає еритематозна форма недуги (49,9 %), геморагічна форма – у кожного п'ятого. Основною локалізацією місцевого запального процесу є нижні кінцівки (62,9 %).
4. Реєструється зниження частоти ускладнень бешихи (7,9 %).

Література

1. Брико Н.И. Эпидемиология и профилактика стрептококковой (группа А) инфекции / Н.И. Брико, М.В. Журавлев, Н.А. Малышев. – М.: «Северо-Принт», 2003. – 99 с.
2. Еровиченков А. Особенности современной клиники рожи / А. Еровиченков, Н. Брико, А. Горобченко // Врач. – 2004. – № 2. – С. 32-34.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. Efstramlou A. Group A streptococcal in the 1990 s / A. Efstramlou // Antimicrob. Chemother. – 2000. – Vol. 45, N 6. – P. 56-61.

4. Жаров М.А. Прогнозирование рецидивов рожи / М.А. Жаров // Инфекционные болезни. – 2007. – № 1. – С. 32-34.

5. Захараш М.П. Бешиха / М.П. Захараш, С.Ю. Малиновський // Лікарська справа. – 2006. – № 3. – С. 17-24.

6. Шляпников С.А. Рожистое воспаление: взгляд на нестарующую проблему / С.А. Шляпников // Вестник хирургии. – 2004. – №4. – С. 71-74.

7. Гусак И.В. Лечение рожистого воспаления в условиях хирургического стационара / И.В. Гусак // KAARKIV Suprical School. – 2010. – № 4. – С. 129-132.

8. Ратникова Л.И. Клинико-эпидемиологическая характеристика рожи на современном этапе / Л.И. Ратникова, А.Н. Жамбурчинова, Н.Н. Лаврентьева // Инфекционные болезни. – 2008. – № 4. – С. 74-77.

9. Horelt A. The CD14+ CD16+ monocytes in erysipelas are expanded and show reduced cytokine production / A. Horelt // Eur. J. Immunol. – 2004. – Vol 22, N 5. – P.1319-1327.

10. Дунда Н.И. Значение иммунологических критериев в прогнозировании рецидивов и гнойных осложнений при первичной роже / Н.И. Дунда, И.П. Балмасова, П.Г. Филиппков // Инфекционные болезни. – 2008. – Т. 6, № 2. – С. 46-49.

11. Бурданова Т.М. Оптимизация профилактики рецидивов первичной рожи с применением циклоферона / Т.М. Бурданова, К.А. Аитов // Клиническая медицина. – 2010. – № 6. – С. 55-58.

12. Жаров М.А. Рожа: клинико-эпидемиологическая характеристика, совершенствование методов лечения и прогнозирования течения болезни: Автореф. дис. ... докт. мед. наук / М.А. Жаров. – Москва, 2007. – 12 с.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE MODERN ERYSIPELAS

N.I. Ilyina, M.D. Chemych, V.V. Zakhlebayeva, N.O. Kapustyan

SUMMARY. Analyzed the clinical peculiarities of erysipelas. Stated that erysipelas more common in women over 40. An increase in the frequency of primary erysipelas and reduce the rate of relaps. In the structure of the disease prevails erythematous form of disease. The main localization of local inflammation is the lower limbs. Recorded reduction of complications of erysipelas.

Key words: erysipelas, clinic, features.

Отримано 23.05.2014 р.

© Ніколов В.В., 2014
УДК 616.98:579.862.1-036.22

В.В. Ніколов

СУЧАСНА КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕШИХИ В БОЛГАРІЇ

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

У дослідженні представлені дані власних клінічних спостережень і вивчень історій хвороб пацієнтів за п'ятирічний період (з 01.10.2009 по 01.11.2013 р.) в клініці дерматовенерології університетської лікарні «Олександрівська» м. Софія (Болгарія) та описані клінічні особливості бешихової інфекції.

Ключові слова: бешиха, клінічні особливості.

Проблема бешихи залишається актуальною у зв'язку з значною поширеністю, частими рецидивами, розвитком геморагічної форми та ускладнень і несприятливих наслідків, які призводять до тривало непрацездатності й навіть до інвалідизації [1-3]. Бе-

шихове запалення є досить поширеним антропонозом і в інфекційній патології займає 4-е місце, поступаючись лише гострим респіраторним інфекціям, вірусним гепатитам та ВІЛ-інфекції [1, 4-6]. На цю хворобу припадає майже 20 % усіх дерматозів бактерійно етіології [7-12].

Мета роботи – дати клініко-епідеміологічну характеристику бешихового запалення в Болгарії в сучасних умовах.

Пацієнти і методи

Представлені результати обстеження 460 хворих на бешиху, які лікувались стаціонарно в клініці дерматове-