

## ПОШИРЕНІСТЬ ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ФАКТОРИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ЇХ РОЗВИТОК

М. Я. Марищук

*Екстрена медична допомога, м. Луцьк*

---

У статті проаналізовано поширеність венеричних захворювань по Волинській області, а також фактори, що спричиняють виникнення даних захворювань.

---

## PREVALENCE OF VENEREAL DISEASES AND FACTORS THAT CONTRIBUTE TO ITS DEVELOPMENT

M. Ya. Maryshchuk

*Emergency care, Lutsk, Volyn region*

---

The article analyzes the prevalence of venereal diseases in Volyn region, as well as factors that contribute to the occurrence of these diseases.

---

**Вступ.** Венеричні хвороби – одна із серйозних соціальних і психологічних проблем сьогодення. Рівень захворюваності на сифіліс за останні 10 років зріс у десятки разів. Значного поширення набули захворювання, що передаються статевим шляхом другого покоління: хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, цитомегаловірусна інфекція [6].

Соціальне значення венеричних захворювань визначається їх розповсюдженістю, тяжкістю наслідків для здоров'я хворого, впливом на нащадків. Негативна демографічна ситуація значною мірою зумовлена високим рівнем захворювань, що передаються статевим шляхом. Вкрай недостатньою є поінформованість молоді, підлітків про тяжкі захворювання та їх небезпечність [3].

**Основна частина.** Сифіліс – це хронічне інфекційне захворювання, що викликається блідою трепонемою, уражає всі органи і тканини організму, здатне до тривалого та рецидивуючого перебігу. Шляхи зараження: статевий, побутовий (предмети, якими користувався хворий – склянки, ложки, зубні щітки, бритви), трансфузійний, трансплацентарний (від хворої сифілісом матері плоду) [1].

Статистично найбільше хворих виявляють при васерманізації соматичних хворих, вагітних, як статеві контакти, найменший показник самостійних звернень

[4]. Станом на 01.01.2015 р. на диспансерному обліку по Волинській області зареєстровано 839 осіб.

Основна причина поширеності венеричних хвороб – це випадкові статеві зв'язки, що зумовлені як соціальними причинами, так і причинами морально-етичного характеру. Велику роль у зараженні й розповсюдженості венеричних хвороб має алкоголізм і наркоманія. Велика міграція населення, війни, акселерація молоді, невиявлення джерел і статевих контактів – це також ті чинники, що спричиняють зростання ЗПСШ [2].

Венеричні хвороби другого покоління (хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз), а також гонорейна інфекція стають причинами захворювань сечостатевої системи, органів дихання, суглобів, нервової та серцево-судинної систем, призводять до безпліддя і імпотенції та інших тяжких ускладнень [5].

Як бачимо із таблиці 1, в динаміці спостерігається тенденція до збільшення сифілітичної інфекції по Волинській області за 2013–2015 роки. Чоловіків хворіє більше, ніж жінок, хворих підлітків на дану патологію в 2013 році не було, а за наступні два роки було виявлено 2 випадки.

Хворих дітей на сифіліс у 2013–2014 році не було зареєстровано, а в 2015 виявлено 2 хворих (1 хлопчик + 1 дівчинка). За останні 10 років не зареєстровано жодного випадку вродженого сифілісу.

**Таблиця 1.** Поширеність сифілісу на території Волинської області за 2013–2015 роки на 100 тисяч населення

Роки	2013	2014	9 міс. 2015
Захворюваність серед дорослого населення	116 11,2 %	145 14,0 %	107 10,3 %
Чоловіки	56 48,3 %	65 44,8 %	52 48,6 %
Жінки	60 51,7 %	80 55,2 %	55 51,4 %
Діти	-	-	2 (1 хл. + 1 дів.) 0,2 %
Підлітки	-	1 (дів.) 0,1 %	1 (дів.) 0,1 %

Такий показник – це результат якісної і тісної співпраці акушерів-гінекологів, венерологів та урологів. До інших захворювань, що передаються статевим шляхом відносять: гонорею, хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз.

Аналізуючи статистичні дані таблиці 2, можна зробити висновок, що в 2014 році відбулося зниження захворюваності на гонорею на 25,4 %, а за 9 місяців 2015 року зниження на 7,5 %. За 3 роки зареєстрована тільки 1 дитина (дівчинка) і двоє підлітків (1 дівчинка і

1 хлопчик). Позитивним є те, що в 2015 році на гонорейну інфекцію дітей та підлітків не зареєстровано.

Як видно із даних таблиці 3, в динаміці спостерігається зниження поширеності трихомонадної інфекції серед дорослого населення. Насторожує високий показник захворюваності на трихомоніаз серед дитячого населення. Найбільш активно дану патологію виявляють акушери-гінекологи 68,5 %, дерматологи 26,1 %, урологи – 5,4 %.

**Таблиця 2.** Поширеність гонореї на території Волинської області за 2013–2015 роки на 100 тисяч населення

Роки	2013	2014	9 міс. 2015
Захворюваність серед дорослого населення	127 12,2 %	94 9,1 %	64 6,2 %
Чоловіки	88 69,3 %	76 9,1 %	51 79,7 %
Жінки	39 30,7 %	18 9,1 %	13 20,3 %
Діти	-	1 (дів.) 0,1 %	-
Підлітки	2 (1 хл. + 1 дів.) 0,2 %	-	-

**Таблиця 3.** Поширеність трихомоніазу на території Волинської області за 2013–2015 роки на 100 тисяч населення

Роки	2013	2014	9 міс. 2015
Захворюваність серед дорослого населення	1156 111,5 %	1084 104,4 %	761 73,2 %
Чоловіки	193 16,7 %	157 14,5 %	123 16,2 %
Жінки	963 83,3 %	927 85,5 %	638 83,8 %
Діти	-	-	-
Підлітки	8 0,8 %	15 1,5 %	4 0,4 %

**Таблиця 4.** Поширеність хламідіозу на території Волинської області за 2013–2015 роки на 100 тисяч населення

Роки	2013	2014	9 міс. 2015
Захворюваність серед дорослого населення	829 79,9 %	705 67,9 %	276 26,5 %
Чоловіки	164 19,8 %	169 24,0 %	47 17,0 %
Жінки	665 80,2 %	536 76,0 %	229 83,0 %
Підлітки	1 (дів.) 0,1 %	3 (дів.) 0,3 %	-

Статистичні дані таблиці 4 підтверджують тенденцію до зниження поширеності хламідійної патології. Хворих дітей не зареєстровано, є випадки захворювання серед підлітків у 2013–2014 роках.

**Висновок.** Венеричні хвороби продовжують залишатися серйозною проблемою для людського здоров'я і для країни в цілому. Для боротьби з даною

патологією потрібно об'єднати громадську профілактику, загально-державні, лікувально-просвітні заходи та особисту профілактику, яка полягає у високій моральності, застосуванні засобів контрацепції та своєчасного звернення до спеціалізованих медичних закладів противенеричної допомоги.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Новосад Л. С. Шкірні та венеричні хвороби / Л. С. Новосад, В. В. Лабінський. – К. : Здоров'я, 2000. – С. 111–137.
2. Бернацький П. Й. Організація правового забезпечення боротьби з венеричними хворобами / П. Й. Бернацький, О. І. Хара, О. А. Кащенко. – Тернопіль, 1996. – 19 с.
3. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / под. ред. И. И. Маврова, М. Н. Бухарович, Б. Т. Глухенький. – К. : Здоров'я, 1989. – 384 с.

4. Потоцький І. І. Шкірні та венеричні хвороби : підручник для медучилищ / І. І. Потоцький. – К. : Вища школа, 1981. – 200 с.
5. Самцов В. И. Руководство по кожным и венерическим болезням / В. И. Самцов. – Л. : Медицина, 1990. – 240 с.
6. Скрипкин Ю. К. Кожные и венерические болезни : учебник для студентов медицинских институтов / Ю. К. Скрипкин. – М. : Медицина, 1980. – 552 с.

Отримано 12.04.16