

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЦИНКУ АСПАРАГІНАТУ З КИСЛОТОЮ АСКОРБІНОВОЮ ТА ЕКСТРАКТОМ ЕХІНАЦЕЇ

© В. М. Коваль

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Резюме: методом регресійного аналізу встановлено вплив кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї.

Ключові слова: таблетки, цинку аспарагінат, кислота аскорбінова, екстракт ехінацеї, допоміжні речовини.

Вступ. З розвитком техніки і технології, забрудненням навколошнього середовища спостерігається збільшення кількості захворювань, пов'язаних із порушенням діяльності імунної системи. Для комплексного лікування та профілактики захворювань, пов'язаних з вторинними імунодефіцитами, широко застосовують препарати солей цинку [5]. Для досягнення максимального імуностимулювального ефекту солі цинку доцільно поєднувати з іншими імуноактивними компонентами. Раціональним є поєднання солей цинку та екстракту ехінацеї та кислотою аскорбіновою [6].

Таблиця 1. Фактори та їх рівні, що вивчали при розробці оптимального складу таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї

Фактор	Рівень фактора				
	нижня зіркова точка «- α»	нижній рівень «- »	основний рівень «0»	верхній рівень „+”	верхня зіркова точка «+ ω»
x_1 – маса неусиліну US 2 на одну таблетку, г	0,00096	0,00300	0,00600	0,00900	0,01104
x_2 – маса лудіфлешу на одну таблетку, г	0,03950	0,0600	0,09000	0,12000	0,1404
x_3 – маса поліплаздону XL 10 на одну таблетку, г	0,00570	0,01800	0,03600	0,05400	0,0663

Було реалізовано 14 дослідів, а для визначення помилки експерименту введено додаткові 6 серій. В результаті досліджень встановлено, що процес пресування таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї проходив без ускладнень. Всі 20 експериментальних серій були спресовані без за-

уважень і дефектів поверхні таблеток. Отримані таблетки випробовували згідно з фармакопейними вимогами [1].

Матрицю планування експерименту та результати дослідження таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Матриця планування експерименту та результати дослідження таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї

Номер серії	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8
1	+	+	+	0,64	0,79	20,3	32	0,8	64	1,3	3
2	-	+	+	0,66	0,88	21,84	35	4,64	57	6,3	3

Продовження табл. 2

Номер серії	x1	x2	x3	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8
3	+	-	+	0,64	0,83	21,48	32	1,81	61	0,8	1
4	-	-	+	0,63	0,83	21,26	33	2,64	79	0,9	5
5	+	+	-	0,66	0,84	16,54	32	1,8	73	1,2	6
6	-	+	-	0,67	0,87	15,58	32	1,2	63	0,7	4
7	+	-	-	0,67	0,89	13,84	36	5,13	39	5,2	2
8	-	-	-	0,63	0,81	18,2	35	1,4	50	0,9	6
9	+1,682	0	0	0,65	0,84	19,46	32	1,82	57	0,3	2
10	-1,682	0	0	0,65	0,87	22,18	35	2,19	62	1,8	7
11	0	+1,682	0	0,64	0,84	19,8	35	1,37	64	4,5	4
12	0	-1,682	0	0,62	0,83	16,88	33	2,24	60	3,2	3
13	0	0	+1,682	0,64	0,83	22,18	34	3,3	85	0,9	2
14	0	0	-1,682	0,67	0,86	13,84	33	3,5	52	0,8	5
15	0	0	0	0,64	0,83	21,68	34	1,69	56	1,1	1
16	0	0	0	0,64	0,83	19,14	32	1,65	53	0,8	1
17	0	0	0	0,64	0,82	21,02	33	1,54	54	1,1	2
18	0	0	0	0,63	0,83	23,12	32	1,65	59	0,9	2
19	0	0	0	0,64	0,83	21,84	33	1,67	56	1,4	2
20	0	0	0	0,63	0,83	22,92	33	1,53	59	1,2	2

Примітки: 1) y_1 – насипна густина вільна, г/мл; 2) y_2 – насипна густина після усадки, г/мл; 3) y_3 – плинність маси для таблетування, 100 г/с; 4) y_4 – кут природного укусу, 0; 5) y_5 – однорідність маси таблеток, %; 6) y_6 – стійкість таблеток до роздавлювання, Н; 7) y_7 –стираність таблеток, % ; 8) y_8 – розпадання, хв.

Результати й обговорення. Результати експерименту, наведені в таблиці 2, аналізували за допомогою рівнянь регресії. Так, взаємозв'язок між вивченими факторами і вільною насипною густину порошкових мас для таблетування описується наступним рівнянням регресії:

$$y_1 = 0,636 + 0,007x_2 - 0,008x_3 - 0,01x_1x_2 - 0,005x_1x_3 + 0,006x_1^2 + 0,0076x_3^2$$

Як видно з даного рівняння, на вільну насипну густину достовірно впливає кількість лудіфлешу та поліплаздону XL 10. Збільшення кількості лудіфлешу в таблетковій масі призводить до збільшення вільної насипної густини, а збільшення кількості поліплаздону XL 10 – до її зменшення.

Взаємозв'язок між вивченими факторами та насипною густиною після усадки порошкових мас описується таким рівнянням регресії:

$$y_2 = 0,828 - 0,007x_1 - 0,01x_3 - 0,025x_1x_2 - 0,018x_1x_3 + 0,009x_1^2 + 0,005x_3^2$$

Даний математичний вираз показує, що на досліджуваний показник впливає кількість поліплаздону XL 10 та неуселіну US 2. Збільшення кількості цих двох компонентів в масі для таблетування призводить до зменшення насипної густини після усадки.

Зміна плинності маси для таблетування від досліджуваних факторів описується таким рівнянням регресії:

$$y_3 = 21,62 + 2,54x_3 - 1,22x_2^2 - 1,34x_3^2$$

Аналіз рівняння показав, що на досліджуваний показник найбільш суттєво впливає зміна кількості поліплаздону XL 10. Збільшення його вмісту призводить до збільшення часу витікання маси для таблетування з лійки.

Вплив досліджуваних факторів на кут природного укусу мас для таблетування цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї відображає таке рівняння регресії:

$$y_4 = 32,83 - 0,59x_1 + 1,125x_2x_3$$

Як видно з даного рівняння регресії, на кут природного укусу впливає вміст неуселіну US 2 в масі для таблетування. Зі збільшенням маси даного компоненту кут природного укусу збільшується.

Взаємозв'язок між досліджуваними факторами і однорідністю маси таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї описується таким рівнянням регресії:

$$y_5 = 1,621 - 0,07x_1 - 0,293x_2 - 0,768x_1x_2 - 1,125x_1x_3 + 0,565x_2x_3 + 0,131x_1^2 + 0,06x_2^2 + 0,624x_3^2$$

На однорідність маси таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом

ехінацеї впливає кількість неусіліну US 2 та лудіфлешу. Зменшення вмісту даних компонентів сприяє збільшенню відхилення від середньої маси таблеток.

Вплив досліджуваних факторів на стійкість до роздавлювання відображає таке рівняння регресії:

$$y_6 = 56,145 + 2,573x_2 + 6,424x_3 + 5,75x_1x_2 - 8,75x_2x_3 + 3,112x_3^2$$

Відповідно до отриманого рівняння, на стійкість до роздавлювання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї впливає вміст лудіфлешу і поліплаздону XL 10. Вплив даних факторів на досліджуваний показник залежить від того, на якому рівні вивчались усі інші фактори (рис.1).




Рис. 1. Вплив кількості лудіфлешу на стійкість до роздавлювання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї.

При стабілізації фактора x_1 на нижній зірковій точці, а фактора x_3 на верхній зірковій точці зі зміною вмісту лудіфлешу в таблетці в інтервалі від "-a" до "+a" стійкість до роздавлювання зменшується. Стабілізація фактора x_1 на верхній зірковій точці, а фактора x_3 на нижній зірковій точці при збільшенні кількості лудіфлешу в таблетці в інтервалі від "-a" до "+a", навпаки, призводить до збільшення міцності таблеток.

Найбільше значення стійкості таблеток до роздавлювання спостерігається при стабілізації факторів x_1 та x_2 на нижній зірковій точці, а фактора x_3 – на верхній зірковій точці.

Зміна показників стирання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї від вивчених факторів описується рівнянням регресії:

$$y_7 = 1,08 - 0,21x_1 + 0,28x_2 - 1,09x_1x_2 - 1,24x_1x_3 + 1,26x_2x_3 + 1,02x_2^2$$

На стійкість до стирання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї найбільш суттєво впливає зміна кількості неусіліну US 2 (x_1) та лудіфлешу (x_2). При зміні рівнів фактора x_1 в інтервалі від "-a" до "+a" спостерігається зменшення відсотка стирання, а збільшення кількості лудіфлешу, навпаки, призводить до погіршення стійкості до стирання таблеток.

Вплив досліджених факторів на розпадання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї описується рівнянням регресії:

$$y_8 = 1,672 - 1,055x_1 - 0,809x_3 + 1,250x_1x_2 + 0,956x_1^2 + 0,603x_2^2 + 0,603x_3^2$$

Аналіз даного рівняння показав, що найбільший вплив на процес розпадання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї появляють фактори x_1 та x_3 . Зменшення кількості неусіліну US 2 та лудіфлешу в таблетках призводить до збільшення часу розпадання. Варто також вказати, що в жодній з 20 серій випробувань час розпадання таблеток не перевищував 7 хв.

Серед вивчених факторів на основі перетворень рівнянь регресії та результатів експериментальних досліджень апропоновано такий склад таблеток: цинку аспарагінату – 0,02500 г, кислоти аскорбінової – 0,30000 г, екстракту ехінацеї сухого – 0,1000 г, неусіліну US 2 – 0,01104 г, – лудіфлешу 0,09000 г, поліплаздону XL 10 – 0,03600 г, МКЦ 102 – 0,03196 г, магнію стеарату – 0,00600 г.

Технологія таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї здійснюється методом прямого пресування.

Запропонований спосіб отримання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї отримав патент України на винахід [7].

Висновки. 1. Вивчено вплив кількісних факторів на основні фармако-технологічні властивості таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї. 2. За допомогою методу регресійного аналізу встановлено основні фармако-технологічні властивості таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї. 3. Запропоновано оптимальний склад і технологію таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї методом прямого пресування.

Література

1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство "Науково-експертний фармакопейний центр". – 1-ше вид. – Харків : РІРЕГ, 2001. – 556 с.
2. Коваль В. М. Дослідження з вибору допоміжних речовин з метою отримання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї / В. М. Коваль, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №1 (25). – С. 74–78.
3. Коваль В. М. Вивчення впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї / В. М. Коваль // Фармацевтичний часопис. – № 2. – 2013. – С. 48–51.
4. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / [Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко та ін.]. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 368 с.
5. Сергеев П. В. Цинксодержащие препараты как модуляторы иммунной системы / П. В. Сергеев, Н. А. Шимановский, К. Г. Гуревич // Международный медицинский журнал. – 2000. – № 4. – С. 99–102.
6. Шарафетдинов Х. Х. Оценка иммуномодулирующей активности комбинированных препаратов с содержанием цинка и эхинацеи / Х. Х. Шарафетдинов, Т. Б. Сенцовова // Лечащий врач. – 2012. – № 2. – С. 104–106.
7. Пат. № 73325 Україна, МПК А 61 К 9/20, А 61 К 35/00. Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової / Коваль В. М., Грошовий Т. А., Вронська Л. В., Кліщ І. М., Господарський І. Я.; заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – и 2012 00675; заявл. 23.01.2012.; опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18.

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК ЦИНКА АСПАРАГИНАТА С КИСЛОТОЙ АСКОРБИНОВОЙ И ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

В. Н. Коваль

Vinnytsia National Medical University by M. I. Pyrohov

Резюме: методом регрессионного анализа установлено влияние количеств вспомогательных веществ на фармако-технологические свойства таблеток цинка аспарагината с кислотой аскорбиновой и экстрактом эхинацеи.

Ключевые слова: таблетки, цинка аспарагинат, аскорбиновая кислота, экстракт эхинацеи, вспомогательные вещества.

OPTIMIZATION OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF THE TABLETS WITH ZINC ASPARTATE, ASCORBIC ACID AND ECHINACEA EXTRACT

V. M. Koval

Vinnytsia National Medical University by M. I. Pyrohov

Summary: the influence of the amount of excipients on pharmaceutical and technological properties of the tablets with zinc aspartate, ascorbic acid and Echinacea extract was established with the method of regressive influence.

Key words: tablets, zinc aspartate, ascorbic acid, dry extract of Echinacea purpurea, excipients.