

УДК 618.13-006-085-089

© А. И. ДРОНОВ, Е. А. КРЮЧИНА, А. И. ГОРЛАЧ, Р. Д. ДОБУШ

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

# Экзентерация таза в лечении первичных и рецидивных злокачественных опухолей

A. I. DRONOV, E. A. KRIUCHYNA, A. I. HORLACH, R. D. DOBUSH

National Medical University by A. A. Bohomolets

## ECZENTRATION OF THE PELVIS IN THE TREATMENT OF PRIMARY AND RECURRENT MALIGNANT TUMOR

В данной работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г.

In this work there were analyzed the immediate and remote results of treatment of 76 patients with broadened primary and recurrent tumors of the pelvis who underwent the eczentrization because of primary (n=14) and recurrent (n=62) tumors of the pelvis from 2003 to 2012.

### Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций.

В последние десятилетия экзентерация таза является одним из наиболее радикальных методов лечения злокачественных опухолей таза. Впервые описана Александром Бруншвигом в 1948 г. [1]. В настоящее время экзентерация таза применяется в лечении первичных и рецидивных злокачественных опухолей таза. Показаниями к экзентерации таза являются: рецидив опухоли после радикального лечения, распространённые первичные опухоли таза, опухоли с инвазией в соседние органы и ткани. В литературе описаны различные варианты экзентерации таза: экзентерация таза с сохранением прямой кишки, экзентерация таза с удалением прямой кишки, экзентерация таза с удалением мочевого пузыря. Результаты экзентерации таза зависят от многих факторов: стадии заболевания, состояния здоровья пациента, опыта хирурга. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г.

Целью работы является анализ непосредственных и отдалённых результатов лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г.

### Цель работы:

Целью работы является анализ непосредственных и отдалённых результатов лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г.

### Материалы и методы.

В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г. В нашей работе проанализированы непосредственные и отдалённые результаты лечения 76 больных с распространёнными первичными и рецидивными опухолями таза, которым была выполнена экзентерация по поводу первичных (n=14) и рецидивных (n=62) опухолей таза с 2003 по 2012 г.



