

УДК 616.133-007.2-091.8

© Ю. І. КУЗИК

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Ультразвукові та патоморфологічні критерії діагностики атеросклеротичних бляшок внутрішньої сонної артерії

YU. I. KUZYK

Lviv National Medical University by Danylo Halytsky

ULTRASOUND AND PATHOMORPHOLOGICAL CRITERIA FOR DIAGNOSIS OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUES OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY

Проведено зіставлення результатів патоморфологічного і доопераційного ультразвукового дослідження 220 атеросклеротичних бляшок внутрішньої сонної артерії, видалених при операції каротидної ендартеректомії. Встановлено, що ехографічна картина бляшок визначається поєднаннями різноманітних компонентів, які мають властивості як гіпоекогеністі (атероматоз, некроз і набряк волокнистих структур, скупчення пінистих макрофагів і новостворених судин), так і гіперекогеністі (фіброз, кальциноз). Відповідність ехографічної картини атеросклеротичних бляшок та їх патоморфологічної структури виявлено при дослідженні 82 % однорідних гіпоекогенічних атеросклеротичних бляшок, 72 % однорідних гіперекогенічних, 80 % неоднорідних з перевагою гіпоекогенного компонента, 72 % неоднорідних з перевагою гіперекогенного компонента. Відповідність ехографічної та патоморфологічної картин атеросклеротичних бляшок всіх типів склала 77,2 %.

The correlation of the morphological and preoperative results of the ultrasound examination of 220 atherosclerotic plaques of the internal carotid artery sine ablated as a result of the carotid endarterectomy was carried out. It has been found that the echographic picture of the plaques is defined by the combinations of various components possessing the properties of both hypoechoegeniety (atheromatosis, necrosis and the edema of the fibrous structures). The conformity of the echographic picture of the atherosclerotic plaques and their morphological structure were revealed at the examination of 82 % of homogeneous hypoechoogenic atherosclerotic plaques, 72 % of homogeneous hyperechogenic, 80 % of inhomogeneous ones with the predominance of the hyperechogenic component, 72 % of inhomogeneous with the predominance of the hyperechogenic component. The conformity of the echogenic picture and the morphological structure of the atherosclerotic plaques of all the types have made up 77.2 %.

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки в практику судинної хірургії ввійшло дооператійне ультразвукове дослідження внутрішньої сонної артерії (ВСА), що дозволяє визначати не лише ступінь гемодинамічних змін, але й оцінювати структуру атеросклеротичних бляшок (АСБ) [1–3]. Ультразвукові дані про структуру АСБ разом з клінічними даними і результатами інших методів обстеження мають вирішальне значення для вибору подальшої лікувальної тактики, зокрема вирішення питання про необхідність проведення каротидної ендартеректомії (КЕ) [2, 4].

На сьогодні з'явилися публікації [1, 4–6], присвячені вивченням патоморфологічної структури та ехографічної картини АСБ. Доведено, що гіпоекогенні АСБ представлені переважно атероматозними масами, кристалами холестерину та ксантомічними кілтин. При цьому автори відзначають зв'язок

між ступенем вираження вищевказаних компонентів АСБ і виникненням порушень мозкового кровообігу. Так, збільшення об'єму атероматозних мас або розвиток внутрішньобляшкового крововиливу можуть сприяти розриву її покришки, збільшенню обсягу АСБ з наступним тромбозом ВСА. Крім того, вихід на поверхню АСБ потенційно ембологенного матеріалу (кристалів холестерину, атероматозних мас, кальцифікатів) може привести до емболії ВСА та її гілок [5].

Повний збіг патоморфологічної структури АСБ, видалених при КЕ (дослідження біоптатів), і їх ехографічної картини спостерігався у 67–90 % хворих [2, 4, 5]. Така розбіжність результатів досліджень вказує на необхідність подальшого поглибленого вивчення патоморфологічної структури АСБ ВСА і порівняння її з даними ультразвукового дослідження з метою виявлення компонентів АСБ, які визначають відповідні ехографічні ознаки, а також при-

чини невідповідності їх ультразвукової та патоморфологічної картини АСБ, що і стало метою нашого дослідження.

Матеріали і методи. Ми провели патоморфологічне дослідження 220 випадків операційного матеріалу ВСА, отриманих при операції КЕ за десять років (2004–2013 рр.). Прооперовано 210 хворих (у 10 операцію виконано на обидвох ВСА). Обстеження та лікування проводили у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Серед хворих було 178 чоловіків і 42 жінки віком від 50 до 85 років. Розподіл хворих за віковими групами такий: 50–59 років – 48, 60–69 років – 120, 70–79 років – 32, старші 80 років – 10. Етап обстеження всі пацієнти проходили за стандартизованою схемою. Після клініко-лабораторного дослідження проводили інструментальне обстеження. До і після операції хворих оглядав невропатолог. При необхідності пацієнтів консультували кардіолог, окуліст, отоларинголог. Діагноз встановлювали при дуплексному ультразвуковому скануванні СА (ультрасонографічний апарат “Ultramark-9” фірми ATL).

За даними ультразвукового дослідження, у всіх хворих стеноз ВСА був не менше 50 %, при цьому в 172 хворих ступінь стенозу досягав 70 % і більше. За класифікацією, запропонованою Grey-Weale A. C. et al. [7], АСБ поділено на чотири види за ехографічною картиною: однорідні гіпоекогенні АСБ – 44, однорідні гіперекогенні АСБ – 56, неоднорідні АСБ із переважанням гіпоекогенного компонента – 87 і неоднорідні АСБ із переважанням гіперекогенного компонента – 33.

Операційний матеріал фіксували в 10 % розчині формаліну, розрізали на кілька блоків. Блоки заливали в парафін, зріз товщиною 5–8 мкм зафарбовували гематоксиліном та еозином, фукселіном за Вейгертом, резорцин-фуксином за Хартом.

Результати досліджень та їх обговорення. З метою зіставлення результатів патоморфологічного і ультразвукового дослідження всі АСБ були поділені на шість груп. В основі поділу на ці групи – ступінь вираження атероматозу, фіброзу і кальцину в АСБ, а також різні поєднання цих компонентів.

У I групу включено 48 АСБ, в яких переважав атероматоз. Фіброз був незначний та виявлявся лише в покришці.

II групу склали 27 АСБ, в яких фіброз переважав над атероматозом та спостерігався в глибині бляшки.

В III групу включено 56 АСБ, основну масу яких становив атероматоз, як в I групі, але на відміну від неї, поєднувався із фіброзом та кальцином.

Останній мав вигляд невеликих дифузних петрифікатів, які займали до 1/4 поперечних зrzів АСБ.

IV групу склали 39 АСБ, в яких переважали фіброз і кальциноз. Атероматоз був вираженим незначно, спостерігався у вигляді невеликих вогнищ, тоді як вогнища петрифікації займали більш ніж 1/3 поперечних зrzів АСБ.

V група представлена 30 АСБ, для яких характерне поєднання фіброзу з кальцинозом; атероматоз у цих АСБ виявлений не був.

VI група складалася з 20 АСБ, в яких переважав фіброз, інші компоненти майже відсутні.

Серед 66 однорідних гіпоекогенних АСБ ехографічна картина 34 з них (I і III групи) повністю відповідала їх патоморфологічній структурі. Це пов’язано із значним переважанням у них гіпоекогенних компонентів (атероматоз) над гіперекогенними (фіброз і петрифікація). В 20 АСБ інших груп також виявлено відповідність патоморфологічної структури ехографічній картині. При цьому як гіпоекогенний компонент поряд з атероматозом виступали інші структурні компоненти АСБ. Так, в восьми з АСБ II групи, серед волокнистих структур виявлено велике скupчення ксантомінних клітин, що, вірогідно, знижувало ехогенність переважаючого в АСБ фіброзного компонента і поряд з вогнищем атероматозу зумовило однорідну ехоструктуру і знижену ехогенність. Як компоненти, що визначають гіпоекогенність АСБ, могли виступити: масивний некроз волокнистих структур (сім АСБ I групи), велика кількість новостворених судин (шість АСБ V і VI груп), пристінковий тромб із початковими явищами організації (три АСБ VI групи). Слід також підкреслити, що такий гіперекогенний компонент, як петрифікація (шість АСБ V групи), був представлений невеликими вогнищами і, ймовірно, не мав суттевого впливу на ультразвукові дані. Ехографічна картина семи АСБ II і IV груп не відповідала їх патоморфологічній структурі у зв’язку з переважанням гіперекогенного компонента фіброзу над гіпоекогенным – атероматозу (в чотирьох АСБ II групи) і відсутністю атероматозу (в двох АСБ VI групи).

Повний збіг ехографічної та патоморфологічної структури виявлено в 23 АСБ із 47 з IV–VI груп однорідних гіперекогенних бляшок, в яких основні гіперекогенні компоненти (фіброз, кальциноз чи їх поєднання) різко переважали над іншими. Однорідність і гіперекогенність шести АСБ з IV групи вірогідно визначалися поєднанням фіброзу з вогнищами кальцинозу, які займали не менше половини поперечних зrzів кожної АСБ. Невідповідність ехографічної картини і патоморфологічної структури АСБ виявлено в 13 випадках (шість АСБ I групи, три – II

групи та чотири – ІІІ групи). При ультразвуковому дослідженні не знайшов відображення такий гіпоекогенний компонент, як атероматоз, що переважав над гіперекогенним компонентами (фіброз, кальциноз) в деяких із цих АСБ (І і ІІІ групи).

При патоморфологічному дослідженні неоднорідних АСБ з перевагою гіпоекогенного чи гіперекогенного компонента виявлено, що неоднорідність їх зумовлена значним атероматозом, кальцинозом і фіброзом або перевагою одного із цих компонентів при їх поєднанні. Так, в 36 із 68 неоднорідних АСБ з перевагою гіпоекогенного компонента І і ІІІ груп основною складовою частиною бляшки був атероматоз. Він був представлений не одним великим вогнищем, як в однорідних гіпоекогенних АСБ, а кількома осередками, розділеними ділянками фіброзу. Вогнища атероматозу займали більше половини поперечних зрізів АСБ. Це вірогідно визначало неоднорідний характер таких АСБ з перевагою гіпоекогенного компонента. В 11 АСБ ІІІ групи спостерігали петрифікацію у вигляді невеликих дифузних вогнищ, що не мала істотного впливу на ехоструктуру бляшки. В 20 АСБ ІV–VI груп з перевагою фіброзу та кальцинозу виявлено додаткові патоморфологічні компоненти, що знижують ехогеність бляшок – масивні скupчення ксантомічних клітин (в шести АСБ), велика кількість новостворених судин (в 10 АСБ), некроз і набряк волокнистих структур (в чотирьох АСБ). Патоморфологічна структура 14 АСБ (четири АСБ ІІ групи, вісім – ІV групи і дві – V групи), в яких переважали гіперекогенні компоненти, не відповідала їх ехографічній картині.

Відповідність ехографічної картини і патоморфологічної структури виявлено в 31 з 39 (79,5 %) неоднорідних АСБ з перевагою гіперекогенного

компоненту. Серед них – три АСБ ІV групи, в яких фіброз і кальциноз значно переважали над атероматозом. Неоднорідну структуру з перевагою гіперекогенного компонента 12 АСБ ІІІ групи, незважаючи на переважання атероматозу, могло визначати поєднання фіброзу і кальцинозу з організованими пристіковими тромбами на поверхні АСБ. Велика кількість новоутворених судин могла виступати в якості гіпоекогенного компонента в 12 АСБ V та VI груп. При цьому ділянки фіброзу з судинами поступалися за площею ділянкам фіброзу без судин (в восьми АСБ VI групи) або петрифікатам (в двох АСБ VI групи). Ехографічна картина 11 бляшок (вісім АСБ І групи і три ІІІ групи) не відповідала їх патоморфологічній структурі у зв'язку із значним переважанням у них вогнищ атероматозу.

Висновки. 1. Ехографічна картина АСБ ВСА визначається поєднаннями її різноманітних компонентів, що мають якості як гіпоекогенності (атероматоз, некроз і набряк волокнистих структур, скupчення ксантомічних клітин і новостворених судин), так і гіперекогенності (фіброз, кальциноз). Переважання певних компонентів у патоморфологічній структурі АСБ зумовлює перевагу гіпоекогенного або гіперекогенного компонента в їх ехографічній картині.

2. Повний збіг даних ехографічної та патоморфологічної картин виявлено при дослідженні 82 % однорідних гіпоекогенних АСБ, 72 % однорідних гіперекогенних АСБ, 80 % неоднорідних АСБ з перевагою гіпоекогенного компонента, 72 % неоднорідних АСБ з перевагою гіперекогенного компонента. Відповідність ехографічної і патоморфологічної картин АСБ всіх типів склала 77,2 %.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Geroulakos G. Ultrasonic carotid plaque morphology / G. Geroulakos, M. Sabetai // Arch. Hel. Med. – 2000. – Vol. 17, № 2. – P. 141–145.
2. Carotid plaque morphology and clinical events / T. Hatsuhashi, S. Ferguson, K. Beach [et al.] // Stroke. – 1997. – Vol. 28, № 1. – P. 95–100.
3. Symptoms, stenosis and carotid plaque morphology. Is plaque morphology relevant? / R. J. Holdsworth, P. T. McCollum, J. S. Bryce [et al.] // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. – 1995. – Vol. 9, № 1. – P. 80–85.
4. Angiogenesis and atherosclerotic carotid plaque: an association between symptomatology and plaque morphology / M. McCarthy, L. Loftus, M. Thompson [et al.] // J. Vasc. Surg. – 1999. – Vol. 30, № 2. – P. 261–268.
5. Гулевская Т. С. Морфологические особенности сосудов атеросклеротических бляшек синуса внутренней сонной артерии (на материале биоптатов, полученных при каротидной эндартерэктомии) / Т. С. Гулевская, В. А. Моргунов, П. Л. Ануфриев // Архив патологии. – 2002. – № 6. – С. 47–50.
6. Кузик Ю. І. Атеросклероз сонних артерій: особливості патоморфологічної картини / Ю. І. Кузик // Медicina транспорту України – 2011. – № 4 (40). – С. 12–16.
7. Carotid artery atheroma: comparison of preoperative B-mode ultrasound appearance with carotid endarterectomy specimen pathology / A. C. Gray-Weale, J. C. Graham, J. R. Burnett, R. J. Lusby // J. Cardiovasc. Surg. – 1988. – Vol. 29, № 6. – P. 676–681.

Отримано 05.03.14